

Coeficientes médios da equação de Angström-Prescott, radiação solar e evapotranspiração de referência em Brasília

Karla Daniele e Silva Dornelas⁽¹⁾, Cícero Lopes da Silva⁽²⁾ e Carlos Alberto da Silva Oliveira⁽²⁾

⁽¹⁾QNL 19, conjunto J, casa 17, CEP 72152-010 Taguatinga, DF. E-mail: karladornelas@gmail.com ⁽²⁾Universidade de Brasília, Fac. de Agronomia e Medicina Veterinária, Caixa Postal 04508, CEP 70919-970 Brasília, DF. E-mail: cicero@unb.br, dasilvao@unb.br

Resumo – O objetivo deste trabalho foi estimar os coeficientes médios a e b da equação de Angström-Prescott, em Brasília, e seus efeitos sobre o cálculo da radiação solar global (R_s) e da evapotranspiração de referência (ET_o). Foram utilizados dados da estação meteorológica da Embrapa Hortaliças, do período de 1978 a 2003. Os coeficientes médios foram determinados por análise de regressão linear, no período todo e em períodos mensais e anuais. Utilizando-se o coeficiente calculado e os propostos pela FAO (0,25 e 0,50) estimaram-se R_s e ET_o, e avaliaram-se os seus desempenhos. Os coeficientes médios mensais a variaram de 0,241 a 0,345, e b de 0,430 a 0,515. Os coeficientes médios anuais a e b foram 0,278 e 0,498, e os do período geral foram 0,282 e 0,490, respectivamente. A performance entre esses coeficientes na estimativa da radiação não diferiu. No mês de julho, foram verificados as piores estimativas e os piores desempenhos. Com as estimativas de R_s e os coeficientes médios calculados, as estimativas de ET_o não diferiram dos observados, tendo-se constatado um ótimo desempenho, independentemente do coeficiente utilizado. Dependendo do tipo de aplicação final dos dados, recomenda-se utilizar, por sua simplicidade, os coeficientes médios obtidos para o período geral.

Termos para indexação: balanço de energia, duração de brilho solar, Penman-Monteith-FAO.

Angström-Prescott equation mean coefficients, solar radiation and reference crop evapotranspiration in Brasília

Abstract – The objective of this work was to estimate Angström-Prescott equation mean coefficients in Brasília, DF, Brazil, and their effects on the calculations of global radiation (R_s) and reference crop evapotranspiration (ET_o). It was used meteorological data from Embrapa Hortaliças weather station, from 1978 to 2003. The mean coefficients were determined by linear regression analysis considering monthly, annual and total periods. Using the calculated coefficients for different periods and those provided by FAO (0.25 and 0.50), R_s and ET_o were estimated and their performances were evaluated. Monthly mean coefficient a varied from 0.241 to 0.345, and b from 0.430 to 0.515. Annual mean coefficients a and b were 0.278 and 0.498, and total means were 0.282 and 0.490, respectively. These coefficients did not differ from each other on radiation estimates. The month of July provided the worse estimates and performance. When using calculated R_s estimates with monthly, annual, total and FAO coefficients, estimated values of ET_o did not differ from observed ones, providing excellent performance, despite the mean coefficient used. Depending on the final application, it is suggested the use of total mean coefficients due to their easiness to estimate the shortwave radiation.

Index terms: energy balance, actual duration of sunshine, FAO-Penman-Monteith.

Introdução

Nos últimos anos, tem-se observado má distribuição das chuvas, em algumas regiões do país, o que provoca sérios problemas para a agricultura e para o abastecimento urbano de água. Tornou-se, então, necessário desenvolver métodos de uso racional de água para diminuir o desperdício, principalmente em sistemas de irrigação.

Um dos principais parâmetros climatológicos que afeta a evaporação da água do solo e a transpiração das plantas é a radiação solar, fator condicionante para a temperatura do ar e do solo (Pereira et al., 2002). Em relação às práticas de manejo da água na agricultura, o saldo de radiação solar é um dos principais elementos atuantes na perda de água pelos vegetais, na decomposição da matéria orgânica e nos processos metabólicos e biológicos (Ometto et al., 1973; Critchfield, 1974).

De acordo com Fontana & Oliveira (1996), a radiação solar global (R_s) é um elemento meteorológico importante para o cálculo da evapotranspiração, realização de zoneamentos agroclimáticos, estabelecimento e utilização de modelos de crescimento e produção na agricultura. O grande problema para medir o saldo de radiação solar, nas estações meteorológicas, é o alto custo dos instrumentos a serem instalados e sua manutenção, que requer calibrações contínuas.

A radiação solar é medida por instrumentos como os radiômetros, actinógrafos bimetálicos e piranômetros, que também medem a radiação difusa, sendo este último o mais utilizado no Brasil. Quando a R_s não está disponível no local, ela pode ser estimada com maior precisão, sendo necessário determinar os coeficientes de regressão a e b da equação de Angström-PreScott para os respectivos locais. Esses coeficientes dependem, principalmente, das características físicas da camada atmosférica a ser atravessada pela radiação solar e são influenciados pela latitude e altitude do local e pela época do ano. Quanto maior a latitude, maior a amplitude da radiação solar extraterrestre, entre o verão e o inverno (Pereira et al., 2002).

Vianello & Alves (1991) apresentam valores médios anuais dos coeficientes da equação de Angström-PreScott, para diversas localidades do Brasil, por exemplo: para Salvador, valores de 0,278 e 0,498, e para Viçosa, MG, valores de 0,290 e 0,390, respectivamente, para a e b . Essas localidades se situam em latitudes de 12°58'S e 20°45'S, com altitudes de 8 m e 650 m, respectivamente. No entanto, não foram encontradas, na literatura, informações sobre os coeficientes de Angström-PreScott para Brasília.

Uma revisão nos métodos de estimativa da evapotranspiração de referência (ET_o) foi realizada por especialistas em 1990, que concluíram que para diversas condições de clima os resultados de ET_o, calculados pela equação de Penman-Monteith, apresentavam resultados mais próximos daqueles oriundos de lisímetros de pesagem (Allen et al., 1998), o que sugeria que o método de Penman-Monteith se tornaria padrão para a estimativa da ET_o.

Este trabalho teve como objetivo estimar os coeficientes médios a e b da equação de Angström-PreScott e seus efeitos sobre o cálculo da radiação solar global de ondas curtas e da evapotranspiração de referência, em Brasília.

Material e Métodos

Os dados meteorológicos foram coletados na Embrapa Hortaliças, situada em Brasília, a 15°56'S, 48°8'W e altitude de 997 m. O clima da região, segundo Köppen, é do tipo Cwa (mesotérmico, com inverno seco e verão quente). A precipitação média anual é de 1.360 mm, com temperaturas médias anuais: máxima de 26,7°C e mínima de 16,1°C.

A R_s foi medida no solo, de 1991 a 1997, por uma estação automática, e de 1978 a 1990, e 1998 a 2003, por piranômetro de fotodiodo de silício, num total de 25 anos. A insolação (n), medida por um heliógrafo, a temperatura média do ar (T), a umidade relativa média do ar (UR) e a velocidade do vento, tomado a 2 m de altura (u_2), também fizeram parte das variáveis utilizadas, medidas em estação convencional e automática, conforme os períodos mencionados anteriormente.

Para a determinação dos coeficientes a e b da equação de Angström-PreScott, foram utilizados dados meteorológicos diários. Os coeficientes médios foram determinados em três períodos de tempo: mensal, anual e geral (que compreendeu toda duração da série, sem divisão por ano ou meses).

Os coeficientes médios gerais basearam-se em uma análise de regressão linear, com todos os dados diários de n e R_s medidos no período. Os coeficientes médios anuais foram analisados por meio de regressão linear, com os dados de cada ano. A média dos 25 coeficientes anuais a e b forneceu a média anual. Para cada mês foram geradas 25 equações, tendo-se calculado, ao final, um valor médio mensal de cada coeficiente, e tendo-se gerado, ao todo, 300 equações de regressão, para se determinar os 12 coeficientes mensais.

A equação de Angström-PreScott correlaciona a radiação R_s com a razão de insolação (n/N), por meio da expressão:

$$R_s/R_a = a + b(n/N),$$

em que R_s é a radiação solar global ($\text{MJ m}^{-2} \text{d}^{-1}$); n representa as horas de insolação real (h d^{-1}); N é a duração máxima possível do brilho solar (h d^{-1}); R_a é a radiação extraterrestre ($\text{MJ m}^{-2} \text{d}^{-1}$); a é o coeficiente que expressa a fração da radiação extraterrestre, que atinge a terra em dias totalmente nublados, correspondente à fração difusa; b é o coeficiente complementar que expressa o total de radiação solar global.

O saldo de radiação foi calculado com os dados de R_s observados e estimados pelos coeficientes a e b , obtidos e estimados com os valores médios anuais 0,25 e 0,50, respectivamente, sugeridos pela FAO (Allen et al., 1998).

Utilizou-se a metodologia da FAO (Allen et al., 1998), para se calcular a evapotranspiração de referência pelo método de Penman-Monteith-FAO:

$$ET_o = \{0,408\Delta(R_n - G) + \gamma[900/(T + 273)]u_2(e_s - e_a)\} / [\Delta + \gamma(1 + 0,34u_2)],$$

em que ET_o é a evapotranspiração de referência (mm d^{-1}); R_n é a radiação líquida ou saldo de radiação ($\text{MJ m}^{-2} \text{d}^{-1}$); G é o fluxo de calor no solo, assumido o valor igual a zero; T é a temperatura média do ar diária, medida a 2 m de altura ($^{\circ}\text{C}$); u_2 é a velocidade do vento, medida a 2 m de altura (m s^{-1}); Δ é a declividade da curva de pressão de vapor ($\text{kPa } ^{\circ}\text{C}^{-1}$); e_s é a pressão de saturação de vapor (kPa); e_a é a pressão de vapor real (kPa); γ é a constante psicrométrica ($\text{kPa } ^{\circ}\text{C}^{-1}$).

Os valores de ET_o foram comparados para verificar o desempenho estatístico, utilizando-se o índice de concordância d que, de acordo com Sousa (2004), foi estabelecido por Willmott et al. (1985), e estabelece uma concordância entre valores observados e estimados. O cálculo de d foi feito pela equação:

$$d = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n (E_i - M_i)^2}{\sum_{i=1}^n (|E_i| + |M_i|)^2} \quad \text{e} \quad E_i' = E_i - \bar{M} \quad \text{e} \quad M_i' = M_i - \bar{M}$$

em que d é o índice de Willmott, que varia de 0 a 1; E_i são os eventos estimados; M_i são os eventos medidos; e \bar{M} é a média dos eventos medidos.

O índice de desempenho c é dado por $c = rd$, em que r é o coeficiente de correlação. O critério de julgamento do desempenho dos coeficientes médios a e b , quando aplicados à estimativa da R_s e respectivas ET_o , foi o de Camargo & Sentelhas (1997), para uma situação ideal $r = d = c = 1$ em que, quanto pior as estimativas, mais próximo de zero será a igualdade.

Resultados e Discussão

A análise dos dados meteorológicos de radiação global e da insolação real possibilitou a determinação dos coeficientes médios a e b de Angström-Prescott (Tabela 1). Os valores médios mensais de a variaram de $0,241 \pm 0,04$

(outubro) a $0,345 \pm 0,097$ (julho). Os valores médios mensais de b variaram de $0,430 \pm 0,045$ (janeiro) a $0,515 \pm 0,097$ (setembro). Tiveram, portanto, diferenças de até 36% para a e de até 14% para b , em relação aos valores sugeridos pela FAO (Allen et al., 1998) que foi de 0,25 e 0,50, respectivamente. O maior desvio observado nos valores de a e b ocorreu em agosto, $\pm 0,132$ e $\pm 0,133$, respectivamente. O menor desvio de a foi constatado em janeiro ($\pm 0,037$) enquanto o de b ocorreu em março ($\pm 0,039$). As R_s calculadas e observadas são valores médios mensais. As R_s calculadas foram obtidas a partir de dados diários de insolação real, da radiação extraterrestre do referido dia e dos coeficientes médios de a e b (Tabela 1).

Evidenciou-se que nos meses mais chuvosos e quentes (outubro a abril) ocorreram os menores desvios nos coeficientes a e b , em comparação com os meses frios e secos (maio a setembro). A incidência de poeiras e queimadas na região pode ter contribuído para a maior variabilidade dos coeficientes calculados em agosto, pois provocam maior poluição atmosférica e apresentam frequência variável ao longo dos anos.

Os coeficientes médios para os períodos anual e geral foram 11,2 e 12,8% acima de 0,25, e 0,4 e 2% abaixo de 0,50, valores sugeridos pela FAO (Allen et al., 1998) para a e b , respectivamente. Aplicando-se os valores de a e b , obtidos nos períodos anual e geral na equação de Angström-Prescott na estimativa de R_s , observou-se, matematicamente, que não houve diferença na comparação entre os

Tabela 1. Valores médios mensais, anuais e de todo o período (geral) das radiações solar global (R_s), observadas e calculadas pelos coeficientes a e b da equação de Angström-Prescott, e respectivos coeficientes de determinação R^2 de a e b , obtidos no período de 1978 a 2003, em Brasília.

Média	R_s observada ⁽¹⁾ ($\text{MJ m}^{-2} \text{d}^{-1}$)	R_s calculada ⁽²⁾ ($\text{MJ m}^{-2} \text{d}^{-1}$)	a	b	R^2
Janeiro	19,20±5,32	19,20±5,02	0,301±0,037	0,430±0,045	0,958
Fevereiro	19,90±5,09	19,91±4,97	0,293±0,044	0,460±0,049	0,959
Março	18,93±5,08	18,98±4,76	0,284±0,046	0,499±0,039	0,955
Abril	18,30±4,10	18,49±3,69	0,304±0,045	0,442±0,084	0,932
Mai	17,81±3,59	17,89±3,10	0,301±0,054	0,473±0,088	0,902
Junho	18,35±3,43	18,36±2,56	0,311±0,049	0,502±0,085	0,953
Julho	18,58±2,96	18,61±2,12	0,345±0,097	0,432±0,067	0,825
Agosto	20,04±3,70	19,75±3,16	0,317±0,132	0,449±0,133	0,841
Setembro	19,81±5,06	19,76±4,73	0,269±0,069	0,515±0,097	0,933
Outubro	18,71±5,51	18,71±5,23	0,241±0,040	0,497±0,077	0,940
Novembro	17,96±5,69	18,04±5,02	0,264±0,062	0,464±0,109	0,908
Dezembro	18,40±5,13	17,29±4,66	0,296±0,047	0,452±0,090	0,918
Anual	18,84±4,38	18,92±4,56	0,278±0,034	0,498±0,052	0,928
Geral	18,83±4,69	18,92±4,49	0,282	0,490	0,810

⁽¹⁾Valores médios medidos. ⁽²⁾Valores estimados a partir dos respectivos coeficientes médios de a e b .

valores estimados e observados, o que sugere que ambos podem ser utilizados na estimativa de R_s .

Comparando-se os valores dos coeficientes médios anuais da equação de Angström-PreScott, determinados neste trabalho ($a = 0,278$ e $b = 0,498$), com os valores médios anuais dos Municípios de Salvador e de Viçosa (Vianello & Alves, 1991), observa-se que, neste caso, o valor de a situou-se entre os daquelas localidades. Entretanto, o valor de b ficou acima e mais próximo do valor recomendado pela FAO (0,50). No entanto, esta é a primeira determinação, para Brasília, dos valores desses coeficientes, daí a impossibilidade de se fazer comparações com outros resultados.

Na Figura 1, está descrita a análise de regressão entre as razões R_s/R_a e n/N , realizada para a obtenção dos valores médios de a e b , considerando-se o agrupamento das variáveis meteorológicas em todo o período estudado. O valor de R^2 , igual a 0,81, indica boa relação de dependência da razão R_s/R_a com a razão de insolação n/N .

Comparando-se as R_s observadas, com as simuladas (Tabela 2), foi constatado, de maneira geral, que de maio a agosto o desempenho dos coeficientes médios mensais a e b , na estimativa desta radiação, foram inferiores aos desempenhos dos outros períodos. Verifica-se que o pior desempenho na estimativa de R_s ocorreu em julho, classificado como sofrível, independentemente da maneira como se obtiveram os valores de a e b (geral, anual, mensal e os propostos pela FAO). Os piores desempenhos verificados, nos meses de frio e de seca, podem ser indicativo de que a equação de Angström-PreScott simula melhor as R_s em períodos de maior nebulosidade e umidade relativa do ar.

Nos meses de janeiro, fevereiro, março e outubro ocorreram os melhores desempenhos na estimativa da R_s , classificados como ótimos. A exceção foi em março, quando se usaram os coeficientes a e b sugeridos pela FAO, que apresentaram desempenho muito bom. Pela semelhança de desempenho no cálculo da R_s , independentemente de como foram obtidos os coeficientes a e b , sugere-se o uso dos valores médios gerais para se estimar R_s .

Na Figura 2, estão descritos os resultados da análise dos dados da R_s observada e estimada com os coeficientes médios para os períodos anuais, geral, e o da FAO.




Figura 1. Coeficientes a e b que compreendem o período geral (1978 a 2003), a partir dos dados diários do quociente entre a radiação solar global e a extraterrestre (R_s/R_a), decorrente da razão de insolação (n/N) e o seu respectivo R^2 .

Tabela 2. Desempenho dos coeficientes médios a e b mensal, anual e geral calculados, e dos sugeridos pela FAO, na estimativa da radiação solar global (R_s), utilizando-se a equação de Angström-PreScott, com seus respectivos R^2 e índices de desempenho c .

Mês	Mensal			Anual			Geral			FAO		
	a e b calculados ⁽¹⁾			$a = 0,278$ e $b = 0,498$			$a = 0,282$ e $b = 0,490$			$a = 0,25$ e $b = 0,50$		
	R^2	c	D ⁽²⁾	R^2	c	D	R^2	c	D	R^2	c	D
Janeiro	0,892	0,917	OT	0,892	0,916	OT	0,892	0,916	OT	0,892	0,909	OT
Fevereiro	0,839	0,876	OT	0,840	0,876	OT	0,840	0,876	OT	0,840	0,869	OT
Março	0,820	0,860	OT	0,820	0,860	OT	0,819	0,859	OT	0,821	0,848	MB
Abril	0,636	0,708	B	0,721	0,779	MB	0,720	0,779	MB	0,723	0,779	MB
Maio	0,635	0,704	B	0,638	0,709	B	0,637	0,708	B	0,640	0,700	B
Junho	0,627	0,685	B	0,627	0,667	B	0,627	0,663	B	0,627	0,638	MD
Julho	0,499	0,569	SF	0,504	0,584	SF	0,504	0,582	SF	0,506	0,567	SF
Agosto	0,593	0,668	B	0,598	0,675	B	0,597	0,674	B	0,600	0,662	B
Setembro	0,775	0,824	MB	0,775	0,823	MB	0,774	0,822	MB	0,776	0,815	MB
Outubro	0,839	0,876	OT	0,839	0,860	OT	0,839	0,859	OT	0,839	0,875	OT
Novembro	0,768	0,817	MB	0,768	0,811	MB	0,768	0,809	MB	0,768	0,820	MB
Dezembro	0,813	0,843	MB	0,813	0,898	OT	0,813	0,898	OT	0,813	0,897	OT

⁽¹⁾Cálculo feito com os valores médios mensais de a e b extraídos da Tabela 1. ⁽²⁾Desempenho (D): ótimo (OT), muito bom (MB), bom (B), mediano (MD) e sofrível (SF).




Figura 2. Comparação entre as correlações das R_s medidas e estimadas pelos coeficientes médios anuais, geral e os sugeridos pela FAO, com seus respectivos R² e desempenhos.

Nela, estão apresentados dados diários dos 25 anos utilizados neste trabalho. Na análise desses dados, observa-se que o desempenho foi classificado como muito bom para o cálculo de R_s, embora à primeira vista, tende-se subestimar os valores simulados.

A Figura 3 exemplifica, para o mês de julho, o pior desempenho na estimativa da R_s, em comparação com a R_s medida; este fato é um reforço do que é observado na Tabela 2, já que esse mês é o mais frio e o de menor nebulosidade na região (Alencar, 2003).

Na Tabela 3, está descrito o desempenho do uso de R_s, oriundo dos diversos coeficientes *a* e *b* testados no cálculo da ETo. Pode-se observar que, para esta finalidade, independentemente de como se obtiveram esses coeficientes, o desempenho foi classificado como ótimo no cálculo da ETo. Entretanto, foram observados, sistematicamente, valores menores de R² em abril e agosto, e maiores valores em janeiro, correspondentes aos períodos de início da época fria, de seca plena e pleno período chuvoso, respectivamente.

Na Figura 4 observa-se também um desempenho ótimo no cálculo da ETo, apesar de ter tido R² um pouco menor do que aquelas da Tabela 3. A ausência de diferença de desempenho no cálculo de ETo, independentemente dos coeficientes *a* e *b* usados no cálculo de R_s, deve-se ao fato de o método de Penman-Monteith-FAO




Figura 3. Comparação entre as correlações das R_s medidas e estimadas pelo coeficiente médio mensal referente a julho, com seu respectivo R² e desempenho.

Tabela 3. Desempenho dos coeficientes médios a e b mensal, anual e geral, e dos sugeridos pela FAO, na estimativa da evapotranspiração de referência (ETo) em mm d^{-1} , utilizando-se a equação de Penman-Monteith-FAO, com seus respectivos R^2 , índices c e desempenho.

Mês	Mensal				Anual				Geral				FAO			
	a e b calculados ⁽¹⁾				$a = 0,278$ e $b = 0,498$				$a = 0,282$ e $b = 0,490$				$a = 0,25$ e $b = 0,50$			
	R^2	c	ETo	D ⁽²⁾	R^2	c	ETo	D	R^2	c	ETo	D	R^2	c	ETo	D
Janeiro	0,940	0,942	4,2	OT	0,942	0,961	4,2	OT	0,943	0,962	4,2	OT	0,943	0,959	4,0	OT
Jeveiro	0,925	0,950	4,3	OT	0,923	0,949	4,3	OT	0,924	0,949	4,3	OT	0,924	0,947	4,1	OT
Março	0,906	0,928	4,0	OT	0,906	0,928	4,0	OT	0,906	0,928	4,0	OT	0,907	0,923	3,9	OT
Abril	0,865	0,896	3,9	OT	0,864	0,895	3,9	OT	0,864	0,895	3,9	OT	0,866	0,895	3,8	OT
Mai	0,898	0,922	3,7	OT	0,897	0,921	3,6	OT	0,898	0,922	3,6	OT	0,899	0,920	3,6	OT
Junho	0,905	0,925	3,7	OT	0,905	0,923	3,6	OT	0,905	0,923	3,6	OT	0,904	0,918	3,5	OT
Julho	0,882	0,913	4,0	OT	0,905	0,931	4,0	OT	0,905	0,931	4,0	OT	0,905	0,930	3,9	OT
Agosto	0,865	0,896	4,8	OT	0,864	0,895	4,8	OT	0,864	0,896	4,8	OT	0,864	0,895	4,7	OT
Setembro	0,885	0,916	5,1	OT	0,885	0,916	5,1	OT	0,885	0,916	5,1	OT	0,886	0,917	5,0	OT
Outubro	0,901	0,932	4,7	OT	0,911	0,935	4,8	OT	0,911	0,935	4,8	OT	0,910	0,938	4,7	OT
Novembro	0,931	0,952	4,1	OT	0,929	0,949	4,3	OT	0,929	0,949	4,3	OT	0,930	0,952	4,1	OT
Dezembro	0,930	0,953	4,0	OT	0,928	0,952	4,0	OT	0,928	0,952	4,0	OT	0,928	0,947	3,9	OT

⁽¹⁾Cálculo feito com os valores médios mensais de a e b extraídos da Tabela 1. ⁽²⁾Desempenho (D): ótimo (OT).




Figura 4. Comparação entre as correlações da estimativa da ETo calculada com a R_s medida e a ETo calculada com as R_s , estimadas pelo coeficiente médio mensal, referente a agosto, seu respectivo R^2 e desempenho.

ser um método combinado, que considera, além do saldo de radiação, o componente aerodinâmico do ar no processo de evapotranspiração, diminuindo, assim, a importância relativa da R_s .

Conclusões

1. As estimativas da radiação solar global pela equação de Angström-Preusscott, com os coeficientes médios mensais a e b , quando comparadas com os valores observados, apresentam os piores desempenhos nos meses mais frios e secos.

2. O valor de a e b , encontrado no período geral, pode ser indicado como melhor alternativa para o cálculo da

radiação solar global, em Brasília, pela equação de Angström-Preusscott.

3. Não há diferenças de desempenho no cálculo da evapotranspiração de referência, quando se usa a radiação solar global calculada com os valores médios de a e b , nos períodos mensais, anuais e geral, e os sugeridos pela FAO e a radiação solar global medida.

Agradecimentos

À Embrapa Hortaliças e ao pesquisador Neville Vianna B. dos Reis, pela cessão dos dados meteorológicos para a realização deste trabalho.

Referências

- ALENCAR, D.B.S. de. **Influência do total precipitado, umidade antecedente e intensidade de precipitação no escoamento superficial de uma microbacia hidrográfica do Distrito Federal.** 2003. 56p. Dissertação (Mestrado) - Universidade de Brasília, Brasília.
- ALLEN, R.G.; PEREIRA, L.S.; RAES, D.; SMITH, M. **Crop evapotranspiration-guidelines for computing crop water requirements.** Rome: FAO, 1998. 297p. (Irrigation and drainage paper, 56).
- CAMARGO, A.P.; SENTELHAS, P.C. Avaliação do desempenho de diferentes métodos de estimativa da evapotranspiração potencial no Estado de São Paulo. **Revista Brasileira de Agrometeorologia**, v.5, p.89-97, 1997.
- CRITCHFIELD, H.J. **General Climatology.** Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1974. 447p.
- FONTANA, D.C.; OLIVEIRA, D. Relação entre radiação solar global e insolação para o Estado do Rio Grande do Sul. **Revista Brasileira de Agrometeorologia**, v.4, p.87-91, 1996.

- OMETTO, J.C.; PERRIES, A.; ITIES, B. **Sur l'estimation de la radiation solaire globale et radiation nette**. Versailles: Centre National de Recherche Agronomique, 1973. 11p.
- PEREIRA, A.R.; ANGELOCCI, L.R.; SENTELHAS, P.C. **Agrometeorologia: fundamentos e aplicações práticas**. Guaíba: Agropecuária, 2002. 478p.
- SOUSA, E.T. de. **Análise de dois modelos usados na simulação da infiltração e do escoamento de água em uma bacia hidrográfica do Distrito Federal**. 2004. 65p. Dissertação (Mestrado) - Universidade de Brasília, Brasília.
- VIANELLO, R.L.; ALVES, A.R. **Meteorologia básica e aplicações**. Viçosa: UFV, 1991. 449p.
- WILLMOTT, C.J.; CKLESON, S.G.; DAVIS, R.E.; FEDDEMA, J.J.; KLINK, K.M.; LEGATES, D.R.; O'DONNELL, J.; ROWE, C.M. Statistics for the evaluation and comparison of models. **Journal of Geophysical Research**, v.90, p.8995-9005, 1985.

Recebido em 24 de março de 2005 e aprovado em 22 de março de 2006

